

# RACCOMANDAZIONI ASLTO3 per il rientro a scuola

## Comparsa di sintomi a scuola:

[temp > 37,5°C, mal di gola, congestione nasale, tosse, dispnea, nausea/vomito, cefalea, diarrea, mialgie, diminuzione del gusto e dell'olfatto]

Il referente scolastico contatta i genitori, l'alunno attende in una zona separata con mascherina chirurgica assistito da personale scolastico con mascherina chirurgica

## Comparsa di sintomi a CASA:

[temp > 37,5°C, mal di gola, congestione nasale, tosse, dispnea, nausea/vomito, cefalea, diarrea, mialgie, diminuzione del gusto e dell'olfatto]

**L'alunno deve stare a casa**

I genitori comunicano alla scuola l'assenza per motivi di salute

I genitori contattano il PLS/MMG (pediatra/medico di medicina generale)

TRIAGE TELEFONICO

**Sospetto COVID**

PLS/MMG richiede tampone al SISP che lo esegue;  
**Si consiglia isolamento fiduciario attivo (genitori e contatti stretti, in attesa dell'esito del tampone, vanno al lavoro/scuola con mascherina ed evitano i contatti sociali)**

**POSITIVO**

i **contatti stretti** sono in quarantena e il SISP decida se fare il tampone.

**NEGATIVO**

A giudizio del medico si ripete il test dopo 2/3 gg

Rimane a domicilio fino a guarigione clinica

Altra patologia (tonsilliti, otiti...)

Lo studente non va a scuola fino a guarigione clinica secondo le valutazioni del PLS/MMG

Rientro a scuola con autocertificazione del genitore

**Attestato:** Il paziente può rientrare perché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per il COVID